

EBV 2017n° 3

Nombre d'inscrits : 85

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 14/09/2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 16 Octobre 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : ABP EBV 17-3A

Echantillon de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

Cas clinique

Dans le cadre d'un bilan systématique, une sérologie EBV est prescrite à un jeune homme de 25 ans chez qui une infection à VIH vient d'être diagnostiquée

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

ABP EBV 17-3A	Fabricant Technique	Résultat Qualitatif		Résultat Quantitatif
VCA IgG		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Douteux	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Non rendu	
VCA IgM		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Douteux	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Non rendu	
EBNA		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Douteux	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Non rendu	
EA		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Douteux	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Non rendu	

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

- 01 Absence d'anticorps anti-EBV
- 02 Signes cliniques et résultats compatibles avec à une primo-infection à EBV
- 03 Patient(e) immunisé(e) ; signes cliniques non liés à une infection à EBV
- 04 Syndrome mononucléosique lié à une infection à EBV
- 05 Syndrome mononucléosique non lié à une primo-infection à EBV
- 06 Primo-infection à EBV récente exclue
- 07 Patient(e) immunisé(e), absence de marqueur de primo-infection
- 08 Sérologie sur un nouveau prélèvement nécessaire pour conclure
- 09 PCR EBV indispensable pour conclure
- 10 Primo-infections à EBV et à CMV
- 11 Primo-infection à EBV et primo-infection toxoplasmique
- 12 Primo-infections à EBV, à CMV et à toxoplasme

Commentaires : *Faites des commentaires si vous le jugez utile.*